

冠状病毒疾病 (COVID-19) 加强针与第三针

二者有什么区别？



第三针

- 提供给莫德纳 (Moderna) 和辉瑞 (Pfizer-BioNTech) 疫苗接种者。
- 可在接种第二剂疫苗28天后注射。
- 适用于免疫系统中度或严重减弱、不能很好地抵御感染的人群 (癌症患者、器官移植者等)

加强针

- 可在接种第二剂辉瑞 (Pfizer-BioNTech) 和莫德纳 (Moderna) 疫苗6个月后注射加强针。可在接种首剂强生 (Johnson and Johnson) 疫苗2个月后注射加强针。
- 适合65岁及以上的成年人，长期护理机构的患者，以及有医疗或职业风险的18-64岁成年人。
- 您可从任何一种获授权的冠状病毒疾病 (COVID-19) 疫苗中选择一剂，作为您混合搭配的加强针。请记住，仅考虑将混合搭配的疫苗用于加强针



我可在哪里接种加强针或第三针？

您可在当地的药房、卫生部门或您的初级保健医师处接种



我可在哪里获得更多信息？

有关疫苗接种、加强针和检测的问题，请拨打冠状病毒疾病 (COVID-19) 服务热线：1(800) 889-3931。您也可将您的问题发到 DPH.SICK@Illinois.gov



为什么应该接种加强针或第三针？

疫苗对病毒的抵御作用可能会随着时间的推移而降低，对变种病毒的抵御作用也会降低。现在您可在同一时段接种冠状病毒疾病 (COVID-19) 疫苗和流感疫苗。