

코비드-19 추가 접종 (부스터 샷) vs. 3차 접종

두 가지 예방접종의 차이는 무엇일까요?



3차 접종

- 모더나(Moderna) 및 화이자-바이오엔텍 (Pfizer-BioNTech) 접종자 대상
- 2차 접종 후 28일 경과 시 접종 가능.
- 대상: 면역력이 저하되거나 매우 약하여 감염 저항력이 낮은 분 (암 환자, 장기 이식 환자 등)

부스터 접종

- 화이자 및 모더나 추가 접종은 2차 접종 후 6개월 경과 시 접종 가능. 존슨 앤 존슨 (Johnson and Johnson)의 경우, 1차 접종 후 2개월 경과 시 접종 가능.
- 65세 이상의 노인, 장기 요양 보호 시설 환자, 의료인이나 직업상 위험 요인을 가진 18~64세의 성인
- 승인받은 코비드-19 백신 부스터 중에서 어느 하나를 선택해서 (mix and match) 1회 추가 혼용 접종할 수 있습니다. 혼용 백신은 부스터 접종의 경우에만 적용 가능합니다.



추가 접종이나 3차 접종은 어디서 받을 수 있나요?

지역 약국, 보건소 또는 주치의로부터 받을 수 있습니다.



더 자세한 정보는 어디서 얻을 수 있나요?

백신, 추가 접종 또는 검사에 대해 질문이 있으시면 코비드-19 직통전화 1(800) 889-3931번으로 연락해주시기 바랍니다. 다음 이메일로 문의 내용을 보내주셔도 됩니다
DPH.SICK@Illinois.gov.



추가 접종이나 3차 접종은 왜 필요한가요?

바이러스 저항력은 시간이 지날수록 감소하며 변이 바이러스에 대한 예방 효과는 낮을 수 있습니다. 현재 코비드-19 백신과 독감 백신을 동시에 접종하실 수 있습니다.